



PRE - TEST

BLSD OPERATORI SANITARI

Pagina | 1 di 2

- 1) La condizione che impone l'inizio delle procedure di BLS è**
 - a) La mancanza di coscienza
 - b) Il danno cerebrale
 - c) Il respiro superficiale
 - d) L'assenza del polso radiale

- 2) Il Basic Life Support comprende:**
 - a) Il pronto riconoscimento dell'assenza di coscienza respiro, circolo
 - b) Attivazione precoce del sistema di soccorso
 - c) L'esecuzione della RCP in caso di arresto cardiaco
 - d) Tutti i precedenti

- 3) Di fronte a una persona apparentemente priva di coscienza la prima cosa da fare è:**
 - a) Valutare la coscienza
 - b) Chiamare aiuto
 - c) Valutare la sicurezza
 - d) Valutare se respira o ha circolo

- 4) La percentuale di ossigeno che si può ottenere collegando il pallone autoespandibile alla fonte di ossigeno senza l'utilizzo del reservoir:**
 - a) 21%
 - b) 16%
 - c) 40-50%
 - d) 80-90 %

- 5) Il DAE nell'arresto cardiaco va utilizzato:**
 - a) Successivamente alla valutazione dell'assenza di coscienza
 - b) Subito dopo aver garantito la pervietà delle vie aeree
 - c) Dopo aver eseguito 2 minuti di RCP
 - d) Successivamente alla valutazione dell'assenza della coscienza e del respiro e dei segni di circolo, dopo aver allertato il soccorso avanzato

- 6) Dopo aver erogato 1 shock su indicazione del DAE**
 - a) Avvio l'analisi
 - b) Inizio la RCP per 2 minuti
 - c) Erogo un altro shock
 - d) Controllo se vi sono segni di circolo e se assenti inizio la RCP



- 7) **L'esecuzione corretta della rianimazione cardiopolmonare prevede un rapporto compressioni/ventilazioni**
- a) 15:1
 - b) 5:1
 - c) 1:5
 - d) 30:2
- 8) **Mentre il DAE eroga lo shock:**
- a) Si continua a ventilare il paziente
 - b) Si controllano i segni di circolo
 - c) Si controlla che nessuno tocchi il paziente
 - d) Si continua a praticare RCP
- 9) **Riordinare le seguenti azioni dell'Operatore DAE:**
- a) Collegare il DAE al paziente
 - b) Accendere il DAE
 - c) Erogare lo shock
 - d) Mantenere la sicurezza mentre il DAE esegue l'analisi
- 10) **Quale delle seguenti affermazioni riguardo alla defibrillazione è vera:**
- a) Può essere utilizzata sopra gli 8 anni di età utilizzando le piastre per adulti
 - b) E' una procedura salvavita in caso di AC da FV o TV senza polso
 - c) La sua efficacia si riduce proporzionalmente al tempo trascorso senza RCP
 - d) Tutte le precedenti